



VADEMÉCUM



DIVISIÓN HUMANA

Le ayudamos a vivir mejor



OTC (VENTA LIBRE)

Calamed® Plus

Clasificación: Astringente, antialérgico, anestésico, antiprurítico. Uso tópico.

Principio activo: Cada 100 mL contiene: Calamina 8 g, Óxido de Zinc 8 g, Difenhidramina 1 g y Lidocaína Clorhidrato 2 g.

Indicaciones: Para aliviar el prurito, ardor y molestias causadas por picaduras de insectos no ponzoñosos, hiedra o roble venenoso, quemaduras solares leves, irritaciones cutáneas menores. Alivio en lesiones de varicela, sarampión y rubeola. Indicado para mayores de 6 meses de edad.

Dosis: Aplicar en la zona afectada 3 o 4 veces al día.

Presentación: Frasco con 100 mL. Agitar antes de usar.

**Astringente - Antialérgico
Antiprurítico - Anestésico.**



**Antifúngico tópico de
amplio espectro.**

Clotrimazol 1%

Clasificación: Antifúngico tópico.

Principio activo: Clotrimazol 10 mg/g.

Indicaciones: Infecciones en piel causadas por hongos: *tinea pedis*, *tinea corporis*, *tinea cruris*, *candidiasis*.

Dosis: Aplicar dos veces al día de 2 a 4 semanas.

Presentación: Tubo con 30 g de crema.



Rubefaciente.

Biogel®

Clasificación: Gel frío rubefaciente. Uso tópico.

Principio activo: Mentol 35 mg/g y Alcanfor 2 mg/g.

Indicaciones: Dolores musculares, espasmos o calambres, contusiones, torceduras, fibromialgia y acondicionamiento para el ejercicio.

Dosis: Aplicar en la zona afectada tres veces al día.

Presentación: Tubo con 120 g de gel.

Alcamin® Adulto Spray

Clasificación: Vasoconstrictor nasal.

Principio activo: Oximetazolina 0,5 mg/mL. Contiene Glicerina.

Indicaciones: Congestión nasal debido a gripe, rinitis alérgica, fiebre del heno, sinusitis aguda o crónica, edema intranasal post-operatorio.

Dosis: Mayores de 6 años y adultos: 2-3 atomizaciones en cada fosa nasal cada 12 horas.

Presentación: Frasco atomizador de 15 mL.



Descongestionante Nasal.

Alcamin® Infantil Gotas

Clasificación: Vasoconstrictor nasal.

Principio activo: Oximetazolina 0,25 mg/mL. Contiene Glicerina.

Indicaciones: Congestión nasal debido a gripe, rinitis alérgica, fiebre del heno, sinusitis aguda o crónica, edema intranasal post-operatorio.

Dosis: Niños de 2 a 5 años, 2 a 3 gotas en cada fosa nasal cada 12 horas. Niños menores de 2 años, según prescripción médica.

Presentación: Frasco gotero de 10 mL.



Descongestionante Nasal.

Mir® Gotas

Clasificación: Vasoconstrictor oftálmico.

Principio activo: Tetrahidrozolina 0,5 mg/mL.

Indicaciones: Alivio de hiperemia conjuntival causada por alergia, irritación ocular leve causada por el viento, smog y sol. Indicado para mayores de 6 años de edad.

Dosis: 1-2 gotas cuando sea necesario, hasta 3 veces al día.

Presentación: Frasco gotero con 15 mL.



Vasoconstrictor Oftálmico.

Antifúngico vaginal de amplio espectro en crema.



Clotrivag®

Clasificación: Antifúngico vaginal de amplio espectro.

Principio activo: Clotrimazol 10 mg/g.

Indicaciones:

Infecciones vaginales causadas por levaduras y hongos: *Candida albicans*. Balanitis causada por levaduras.

Dosis: Llenar y poner la carga de un aplicador en la vagina antes de acostarse, durante 7 días.

Presentación: Tubo con 40 g de crema y 7 aplicadores.

Astringente protector tópico en crema.



Oxivit-E®

Clasificación: Protector y regenerador de la piel irritada de uso tópico.

Principio activo: Óxido de Zinc 20%, Pantenol 2%, Vitamina E 0,5% y Vitamina A 0,03%.

Indicaciones: Rozaduras en la piel.

- Pezón irritado y agrietado.
- Irritación alrededor de los senos.
- Irritación en genitales causados por rozaduras.
- Quemaduras de sol.
- Ulceraciones en pacientes encamados.

Dosis: Aplicar en zona afectada 2-3 veces al día.

Presentación: Tubo colapsible con tapa "Flip Top" y 120 g de crema.

Máxima Protección contra la Pañalitis en crema.



Oxivit-E® Infantil

Clasificación: Protector y regenerador de la piel irritada de uso tópico.

Principio activo: Óxido de Zinc 20%, Pantenol 2%, Vitamina E 0,5% y Vitamina A 0,03%.

Indicaciones:

- Dermatitis del pañal (Pañalitis).

Otras Indicaciones:

- Quemaduras leves.
- Irritaciones en la piel.

Dosis: Aplicar en cada cambio de pañal. En quemaduras e irritaciones leves aplicar 2-3 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas.

Presentación: Tubo colapsible con tapa "Flip Top" y 120 g de crema.

DERMATOLÓGICOS

Lapirox®

Clasificación: Antifúngico uso tópico.

Principio activo: Ciclopirox 80 mg/g.

Indicaciones: Onicomicosis en uñas de manos y pies. Indicado para mayores de 5 años de edad.

Dosis: Aplicar una fina capa de laca en las uñas afectadas. Primer mes: día de por medio. Segundo mes: 2 veces por semana. Tercer mes: una vez por semana.

Presentación: 1 Frasco con 5 g, 3 toallas removedoras de laca, 1 cortaúñas y 5 limas.



Laca antifúngica de uso tópico.



Antimicótico/antifúngico en crema.

Alcaderm®

Clasificación: Antimicótico/antifúngico tópico.

Principio activo: Terbinafina 1%.

Indicaciones: Para el tratamiento del pie de atleta (hongos en los pies), infecciones superficiales de la piel causadas por hongos en manos, tórax, ingles o axilas que pueden manifestarse con síntomas como prurito (picazón), ardor y resequead.

Dosis: Aplicar una capa delgada de la crema en el área afectada y piel circundante, 1-2 veces al día, durante 7 días.

Presentación: Tubo colapsible de 30 g de crema.



Antibiótico, antiinflamatorio, antialérgico y antimicótico tópico en crema.

Dermotrex®

Clasificación: Antibiótico, antiinflamatorio, antialérgico y antimicótico de uso tópico.

Principio activo: Cada 100 g de crema contienen:

• Betametasona 0,05 g. • Gentamicina 0,1 g • Clotrimazol 1 g.

Indicaciones: Dermatitis inflamatorias que cursen con infección causada por bacterias y/o hongos.

Dosis: Aplicar 2 veces al día en zona afectada.

Presentación: Tubo con 30 g de crema.



Corticoide tópico en crema.

Betametasona 0,1%

Clasificación: Antiinflamatorio esteroide uso tópico.

Principio activo: Betametasona Valerato 0,1 g/100 g.

Indicaciones: Dermatitis inflamatorias como dermatitis seborreica o atópica, neurodermatitis, prurito anal, psoriasis, xerosis en su fase inflamatoria.

Dosis: Aplicar una fina capa 2-4 veces al día.

Presentación: Tubo con 15 g de crema.



Antiherpético labial en crema.

ACV 200®

Clasificación: Antiviral labial. Uso tópico labial.

Principio activo: Aciclovir 5 g/100 g.

Indicaciones: Herpes labial causado por *Herpes simple tipo I* y *Herpes simple tipo II*.

Dosis: Aplicar en la zona afectada cada 3 horas, durante 7 días.

Presentación: Tubo con 5 g de crema.



Antiherpético en crema.

Aciclovir crema 5%

Clasificación: Antiviral uso tópico.

Principio activo: Aciclovir 5 g/100 g.

Indicaciones: Infecciones en piel y genitales causadas por *Herpes simple tipo I*, *Herpes simple tipo II* y *virus de Varicela Zóster*.

Dosis: Aplicar en la zona afectada 5 veces al día por 5 días.

Presentación: Tubo con 15 g de crema.



Corticoide tópico en crema.

Hidroclortisona 1%

Clasificación: Antiinflamatorio esteroide uso tópico.
Principio activo: Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g.
Indicaciones: Dermatitis inflamatorias que responden a corticoides y dermatosis seborreica del cuero cabelludo.
Dosis: Aplicar una fina capa 4 veces al día durante la fase aguda y de 1-3 veces por semana como mantenimiento.
Presentación: Tubo con 15 g de crema.



Antibiótico y antiinflamatorio tópico en ungüento.

Hidroclortisona Neomicina

Clasificación: Antibiótico, corticoide, antiinflamatorio y antialérgico. Uso tópico.
Principio activo: Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g y Sulfato de Neomicina 3,5 mg/g.
Indicaciones: Tratamiento de procesos inflamatorios e infecciones bacterianas superficiales de la piel como: dermatitis crónica, urticaria, neurodermatitis, quemaduras, úlceras, forúnculos, otitis externa, dermatitis por contacto.
Dosis: Aplicar una fina capa 2 o 3 veces al día.
Presentación: Tubo con 15 g de ungüento.



Antifúngico tópico en crema.

Ketoconazol 2%

Clasificación: Antifúngico uso tópico.
Principio activo: Ketoconazol 20 mg/g.
Indicaciones: *Candidiasis* cutánea, *tiña corporal, crural* y *versicolor*.
Dosis: Aplicar 1 o 2 veces al día durante dos semanas.
Presentación: Tubo con 15 g de crema.



Corticoide tópico en crema.

Mometasona

Clasificación: Antiinflamatorio esteroide uso tópico.
Principio activo: Mometasona 1 mg/g.
Indicaciones: Procesos inflamatorios y pruríticos de la piel como psoriasis y dermatitis atópica.
Dosis: Aplicar una fina capa en la zona afectada 1 vez al día.
Presentación: Tubo con 15 g de crema.



Corticoide tópico en ungüento.

Hidroclortisona Ungüento

Clasificación: Antiinflamatorio esteroide uso tópico.
Principio activo: Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g.
Indicaciones: Dermatitis inflamatorias que responden a corticoides.
Dosis: Aplicar una fina capa 4 veces al día durante la fase aguda y de 1-3 veces por semana como mantenimiento.
Presentación: Tubo con 15 g de ungüento.



Antifúngico tópico en ungüento.

Nistatina

Clasificación: Antifúngico uso tópico.
Principio activo: Nistatina 100.000 UI/g.
Indicaciones: Infecciones susceptibles de la piel, mucocutáneas, causadas por *Candida*.
Dosis: Aplicar 2 o 3 veces al día durante dos semanas.
Presentación: Tubo con 15 g de ungüento.



Antibiótico tópico en ungüento.

Neomicina Bacitracina

Clasificación: Antibiótico aminoglucósido de uso tópico.
Principio activo: Neomicina base 3,5 mg/g y Bacitracina 500 UI/g.
Indicaciones: Infecciones bacterianas superficiales de la piel sensibles a Neomicina y/o Bacitracina: piodermitis, furunculosis, acné, úlceras, heridas, quemaduras, mastitis post-intervención y otitis externa.
Dosis: Aplicar una fina capa en la zona afectada 2 o 3 veces al día.
Presentación: Tubo con 15 g de ungüento.



Antibiótico tópico en ungüento.

Neomicina 2%

Clasificación: Antibiótico aminoglucósido de uso tópico.
Principio activo: Neomicina 20 mg/g.
Indicaciones: Infecciones bacterianas superficiales de la piel.
Dosis: Aplicar una fina capa en la zona afectada 2 o 3 veces al día.
Presentación: Tubo con 15 g de ungüento.

INYECTABLES



**Analgésico
Inyectable de
acción central.**

Tramadol

Clasificación: Analgésico de acción central.

Principio activo: Tramadol Clorhidrato 50 mg/mL.

Indicaciones: Dolor moderado a severo, agudo o crónico, debido a neuralgias, cáncer u otros. Analgesia pre y post quirúrgica.

Dosis: Vía de administración: IM-IV-SC. 50-100 mg cada 6-8 horas. Mayores de 14 años.

*Consultar prospecto.

Presentación: Ampolla 2 mL. Estuche con 5 ampollas y caja con 50 ampollas.



Corticoide inyectable.

Dexametasona Fosfato

Clasificación: Antiinflamatorio esteroide.

Principio activo: Dexametasona Fosfato 4 mg/mL.

Indicaciones: Procesos inflamatorios a nivel reumático como artritis reumatoide, osteoartritis, alergias en piel y vías respiratorias.

Dosis: Vía de administración: IM-IV-IA (intraarticular), IL (intralesional), IS (Intrasinovial) y TB (Tejidos blandos).

*Consultar prospecto.

Presentación: Ampolla 1 mL y caja con 100 ampollas.



**Antiemético
Inyectable.**

Nauseidim®

Clasificación:

Antiemético-antivertiginoso.

Principio activo: Dimenhidrinato 50 mg/mL.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de la náusea, vértigo y vómito, asociados con mareos por movimiento y enfermedad de Ménière.

Dosis: Vía de administración IM-IV Adultos: 50-100 mg cada 4-6 horas. No exceder 400 mg/día.

Niños: 1,25 mg/Kg 4 veces al día. No exceder 300 mg/día.

Presentación: Frasco ampolla con 5 mL y ampolla con 1 mL.



**Anestésico local con preservante
Inyectable.**

Lidocaína Clorhidrato 2%

Clasificación: Anestésico local.

Principio activo: Lidocaína Clorhidrato 20 mg/mL con preservante.

Indicaciones: Procesos donde se requiere anestesia local, por infiltración o bloqueo nervioso.

Dosis: Según el grado de anestesia requerido, vascularización del tejido, duración de la anestesia y la condición física del paciente. La dosis máxima 4,5 mg/kg/dosis, vía IM. No repetir hasta después de 2 horas.

Presentación: Frasco ampolla con 20 mL.



**Anestésico sin preservantes
Inyectable.**

Lidocaína Clorhidrato 2%

Clasificación: Anestésico.

Principio activo: Lidocaína Clorhidrato 20 mg/mL sin preservante.

Indicaciones: Anestesia para cirugías superficiales. Anestesia epidural.

Dosis: Según el grado de anestesia requerido, vascularización del tejido, duración de la anestesia y la condición física del paciente.

Presentación: Frasco ampolla con 20 mL.



**Vitaminas
Inyectables.**

Complejo Vitamínico

Clasificación: Multivitamínico inyectado.

Principio activo:

Vitamina B₁ 50 mg/mL.

Vitamina B₂ 1 mg/mL.

Vitamina B₃ 50 mg/mL.

Pantenol 5 mg/mL.

Indicaciones: Agotamiento físico y mental, convalescencia y deficiencia de vitaminas.

Dosis: Vía de administración IM 1-2 mL/día o IV.

Presentación: Frasco ampolla con 10 mL.



**Vitamina
Inyectable.**

Vitamina B12

Clasificación: Vitamina del Complejo B.

Principio activo: Cianocobalamin 1000 mcg/mL.

Indicaciones: Deficiencia de Vitamina B₁₂ y anemia perniciosa.

Dosis: Vía de administración IM o SC profunda. Adultos 30-100 mcg/día de 5-10 días. Dosis de mantenimiento 100-200 mcg/mes. Niños 1-30 mcg/día de 5-10 días. Dosis de mantenimiento 60 mcg/mes.

Presentación: Frasco ampolla con 10mL.



**Vitamina
Inyectable.**

Vitamina B1

Clasificación: Vitamina del Complejo B.

Principio activo: Tiamina Clorhidrato 100 mg/mL.

Indicaciones: Deficiencia de Tiamina. Suplemento de la dieta. Encefalopatía de Wernicke.

Dosis: Vía de administración IM. Niños menores de 6 meses: 0,3 mg. Niños de 6 meses a 1 año: 0,4 mg. Niños de 1 a 3 años: 0,7 mg. Niños de 4 a 6 años: 0,9 mg. Niños de 7 a 10 años: 1 mg. Niños de 11 a 14 años: 1,1 a 1,3 mg. Mayores de 14 años: de 1 a 1,5 mg.

Presentación: Frasco ampolla con 10 mL.



**Vitamina antihemorrágica
Inyectable.**

Vitamina K1

Clasificación: Vitamina Antihemorrágica.

Principio activo: Vitamina K₁ (Fitomenadiona) 10 mg/mL.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de hemorragias y problemas de coagulación sanguínea. Deficiencia de Vitamina K₁.

Dosis: Vía de administración SC, IM, IV.

*Consultar prospecto.

Presentación: Ampolla con 1 mL.

OFTÁLMICOS



Antibiótico,
antiinflamatorio
y esteroide en
colirio.

Dexaneo® Solución Oftálmica

Clasificación:

Antibiótico-antiinflamatorio esteroideal. Uso oftálmico y ótico.

Principio activo: Dexametasona Fosfato 1 mg/mL y Neomicina 3,5 mg/mL.

Indicaciones: Conjuntivitis bacteriana, queratitis bacteriana y otitis media. Indicado para mayores de 2 años de edad.

Dosis: 1-2 gotas en el ojo u oído afectado cada 6 u 8 horas.

Presentación: Solución oftálmica. Frasco gotero con 5 mL.



Antibiótico, antiinflamatorio
esteroide en ungüento.

Dexaneo® Ungüento

Clasificación:

Antibiótico-antiinflamatorio esteroide. Uso oftálmico.

Principio activo: Dexametasona Fosfato Sódico 0,05 g/100g y Neomicina 0,35 g/100g.

Indicaciones: Infección bacteriana oftálmica que curse con inflamación: conjuntivitis bacteriana, queratitis bacteriana, queratoconjuntivitis, iritis, blefaritis, orzuelos y chalazión. Indicado para mayores de 2 años de edad.

Dosis: Aplicar una pequeña cantidad en el saco conjuntival cada 3 o 4 horas.

Presentación: Tubo con 3,5 g de ungüento oftálmico.



Solución
salina.

Fisiolín® Gotas

Clasificación: Suero fisiológico.

Principio activo: Cloruro de Sodio 0,9%.

Indicaciones:

Descongestionante nasal y humectante oftálmico.

Dosis: Recien nacidos, Niños y adultos: Intranasal: 2-3 gotas en cada fosa nasal, según sea necesario.

Ocular: 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3 o 4 horas.

Presentación:

Frasco gotero con 10 mL.



Antibiótico
en colirio.

Sulfato de Gentamicina

Clasificación: Antibiótico aminoglucósido oftálmico.

Principio activo: Gentamicina 3 mg/mL.

Indicaciones: Blefaritis, orzuelo, chalazión, conjuntivitis, úlceras corneales causadas por microorganismos sensibles, en especial *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *E. Coli* y otros microorganismos gramnegativos.

Dosis: 1-2 gotas en el ojo afectado cada 4 horas.

Presentación: Solución oftálmica. Frasco gotero con 5 mL.



Corticoide
en colirio.

Dexametasona Fosfato 0.1%

Clasificación: Antiinflamatorio esteroide. Uso oftálmico.

Principio activo: Fosfato de Dexametasona 1 mg/mL.

Indicaciones: Inflamación en segmento anterior del ojo: conjuntiva y córnea. Conjuntivitis alérgica. Indicado para mayores de 2 años de edad.

Dosis: 1-2 gotas cada 6 u 8 horas.

Presentación: Solución oftálmica. Frasco gotero con 10 mL.



Anestésico
local
oftálmico
en colirio.

Tetracaína 0,5%

Clasificación: Anestésico local de uso oftálmico.

Principio activo: Tetracaína 5 mg/mL.

Indicaciones: Anestésico local para realizar procedimientos de diagnóstico y cirugías en la parte anterior del ojo.

Dosis: Aplicar 1-2 gotas un minuto antes del procedimiento.

Presentación: Solución oftálmica. Frasco gotero con 10 mL.